

# Intervención coronaria percutánea a lesión aorto ostial del 95% en tronco coronario izquierdo en paciente ambulatorio

## Ficha clínica

- Femenino 92 años.
- Factores de riesgo: edad, sedentarismo.
- Padecimiento: deterioro de clase funcional CCS 2.
- ECOTT no dilatado, FE 69%, movilidad normal, insuficiencia mitral y aórtica leve, PSAP 44 mmHg.
- SPECT isquemia moderada anterior, apical y anterolateral, dilatación transitoria del VI.

CTT 20.05.25

TCI calcificado, lesión aortoostial 95%.






DA calcificada, sin lesiones.

CX sin lesiones.

CD sin lesiones.

## Descripción de procedimiento:

1. Acceso radial derecho, introductor 7 en 6 F.
2. Catéter guía extra soporte.
3. Guías coronarias 0.014 1.2 g a CX y a DA (paciente con lipotimia).
4. Predilatación balón SC 3.5x20 mm (mejoría lipotimia).
5. 2da predilatación balón NC 3.5x20 mm.
6. Implante stent cromo-cobalto liberador everolimus 2.3x23 mm TCI-DA.
7. Optimización con balón NC 4.5x15 mm.
8. POT balón NC 5X15 mm.



F  
i  
n  
a  
l