





TAVI mas ICP compleja TCI y DA

Masculino de 79 años con HAS, diagnostico de Eao severa y cardiopatía isquémica 03/2024, por AI con Enfermedad coronaria obstructiva monovascular con ICP a DA segmento proximal con


stent no medicado Architect 3x34mm exitosa SMQX → TAVI 12/2024



Angiografía pre-TAVI: Reestenosis intrastent Mehran III del stent de la DA, se decide ICP a la DA con stent medicado, Catéter guía JL 3.5 6 F se avanzan guías 0.014 coronarias workhorse hacia DA y CX Se predilata RIS con balón NC 2.5x15mm a 20atm, se coloca stent medicado 2.75x38mm en la DA



Presenta disminución de flujo e imagen de disección en TCI, Se optimiza con balón NC 3x15mm y se coloca stent medicado 3.5x33mm de segmento distal de TCI empalmado con stent de la DA, Angiografía de control, sin complicaciones flujo TIMI 3



Se continua con procedimiento de TAVI, con predilatacion aortica con balón 20 cc, se coloca prótesis valvular aortica autoexpandible 25mm y postdilatación con mismo balón exitoso a los 6 meses se encuentra asintomático, EcoTT sin evidencia de fuga paravalvular, área y gradiente de prótesis adecuados

